

Metody probabilistyczne

3. Prawdopodobieństwo warunkowe

Wojciech Kotłowski

Instytut Informatyki PP
<http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/>

17.10.2019

Motywacja

Jaś i Małgosia losują po jednej rękawiczce z pary.

- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę?

Motywacja

Jaś i Małgosia losują po jednej rękawiczce z pary.

- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę? $\frac{1}{2}$

Motywacja

Jaś i Małgosia losują po jednej rękawiczce z pary.

- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę? $\frac{1}{2}$
- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę, jeśli Małgosia wylosowała prawą rękawiczkę?

Motywacja

Jaś i Małgosia losują po jednej rękawiczce z pary.

- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę? $\frac{1}{2}$
- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę, jeśli Małgosia wylosowała prawą rękawiczkę? 1

Motywacja

Jaś i Małgosia losują po jednej rękawiczce z pary.

- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę? $\frac{1}{2}$
- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę, jeśli Małgosia wylosowała prawą rękawiczkę? 1

Prawdopodobieństwo **zmieniło się** wskutek uzyskania **dodatkowej informacji**.

Motywacja

Jaś i Małgosia losują po jednej rękawiczce z pary.

- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę? $\frac{1}{2}$
- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę, jeśli Małgosia wylosowała prawą rękawiczkę? 1

Prawdopodobieństwo **zmieniło się** wskutek uzyskania **dodatkowej informacji**.

Komplikujemy: Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii:

- Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa?

Motywacja

Jaś i Małgosia losują po jednej rękawiczce z pary.

- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę? $\frac{1}{2}$
- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę, jeśli Małgosia wylosowała prawą rękawiczkę? 1

Prawdopodobieństwo **zmieniło się** wskutek uzyskania **dodatkowej informacji**.

Komplikujemy: Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii:

- Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa? $\frac{4}{52}$

Motywacja

Jaś i Małgosia losują po jednej rękawiczce z pary.

- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę? $\frac{1}{2}$
- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę, jeśli Małgosia wylosowała prawą rękawiczkę? 1

Prawdopodobieństwo **zmieniło się** wskutek uzyskania **dodatkowej informacji**.

Komplikujemy: Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii:

- Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa? $\frac{4}{52}$
- Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa, jeśli Małgosia wylosowała asa?

Motywacja

Jaś i Małgosia losują po jednej rękawiczce z pary.

- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę? $\frac{1}{2}$
- Jaka jest szansa, że Jaś ma lewą rękawiczkę, jeśli Małgosia wylosowała prawą rękawiczkę? 1

Prawdopodobieństwo **zmieniło się** wskutek uzyskania **dotychczasowej** informacji.

Komplikujemy: Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii:

- Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa? $\frac{4}{52}$
- Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa, jeśli Małgosia wylosowała asa? $\frac{3}{51}$

Motywacja

Często pytamy się o prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A **pod warunkiem** zajścia innego zdarzenia B .

Ta dodatkowa informacja o zajściu B może zmienić szanse zajścia A .

Motywacja

Często pytamy się o prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A **pod warunkiem** zajścia innego zdarzenia B .

Ta dodatkowa informacja o zajściu B może zmienić szanse zajścia A .

- Jaka jest szansa wylosowania co najmniej 5 oczek w rzucie kostką (A) jeśli wypadła nieparzysta liczba oczek (B)?
- Wybieramy losowe słowo z angielskiej książki. Jaka jest szansa, że druga litera słowa to „h” (A), jeśli pierwsza to „t” (B)?
- Jaka jest szansa, że losowo wybrany uczeń ma 5 z matematyki (A), jeśli z fizyki otrzymał 2 (B)?

Motywacja

Często pytamy się o prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A **pod warunkiem** zajścia innego zdarzenia B .

Ta dodatkowa informacja o zajściu B może zmienić szanse zajścia A .

- Jaka jest szansa wylosowania co najmniej 5 oczek w rzucie kostką (A) jeśli wypadła nieparzysta liczba oczek (B)?
- Wybieramy losowe słowo z angielskiej książki. Jaka jest szansa, że druga litera słowa to „h” (A), jeśli pierwsza to „t” (B)?
- Jaka jest szansa, że losowo wybrany uczeń ma 5 z matematyki (A), jeśli z fizyki otrzymał 2 (B)?

Takie prawdopodobieństwo nazywamy **warunkowym** i oznaczamy przez:

$$P(A|B)$$

(„prawdopodobieństwo A pod warunkiem B ”).

Przykład

Jaka jest szansa wylosowania co najmniej 5 oczek w rzucie kostką (A) jeśli wypadła nieparzysta liczba oczek (B)?



ω_1



ω_3



ω_5

ω_2



ω_4




ω_6



Przykład

Jaka jest szansa wylosowania co najmniej 5 oczek w rzucie kostką (A) jeśli wypadła nieparzysta liczba oczek (B)?




$$A = \{\omega_5, \omega_6\}$$

$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$$

$$A \cap B = \{\omega_5\}$$

Przykład

Jaka jest szansa wylosowania co najmniej 5 oczek w rzucie kostką (A) jeśli wypadła nieparzysta liczba oczek (B)?



$$A = \{\omega_5, \omega_6\}$$


$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$$

$$A \cap B = \{\omega_5\}$$

Jeśli zaszło B , jedyne możliwe zdarzenia elementarne to $\{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$ (przestrzeń zdarzeń Ω zredukowała się do B)

Przykład

Jaka jest szansa wylosowania co najmniej 5 oczek w rzucie kostką (A) jeśli wypadła nieparzysta liczba oczek (B)?



$$A = \{\omega_5, \omega_6\}$$

$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$$


$$A \cap B = \{\omega_5\}$$

Jeśli zaszło B , jedyne możliwe zdarzenia elementarne to $\{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$ (przestrzeń zdarzeń Ω zredukowała się do B)

Wśród tych zdarzeń tylko $A \cap B = \{\omega_5\}$ sprzyja zdarzeniu A

Przykład

Jaka jest szansa wylosowania co najmniej 5 oczek w rzucie kostką (A) jeśli wypadła nieparzysta liczba oczek (B)?



$$A = \{\omega_5, \omega_6\}$$

$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$$

$$A \cap B = \{\omega_5\}$$


Jeśli zaszło B , jedyne możliwe zdarzenia elementarne to $\{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$ (przestrzeń zdarzeń Ω zredukowała się do B)

Wśród tych zdarzeń tylko $A \cap B = \{\omega_5\}$ sprzyja zdarzeniu A

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{3}$$

Przykład

Jaka jest szansa wylosowania co najmniej 5 oczek w rzucie kostką (A) jeśli wypadła nieparzysta liczba oczek (B)?



$$A = \{\omega_5, \omega_6\}$$

$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$$

$$A \cap B = \{\omega_5\}$$

Jeśli zaszło B , jedyne możliwe zdarzenia elementarne to $\{\omega_1, \omega_3, \omega_5\}$ (przestrzeń zdarzeń Ω zredukowała się do B)

Wśród tych zdarzeń tylko $A \cap B = \{\omega_5\}$ sprzyja zdarzeniu A

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{3} \\ &= \frac{|A \cap B|/|\Omega|}{|B|/|\Omega|} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \end{aligned}$$

Przykład

Rozważmy to samo zadanie dla **nieuczciwej** kostki, w której piątka wypada z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$, a pozostałe liczby z prawd. $\frac{1}{10}$



0.1



0.1



0.5

0.1



0.1




0.1



Przykład

Rozważmy to samo zadanie dla **nieuczciwej** kostki, w której piątka wypada z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$, a pozostałe liczby z prawd. $\frac{1}{10}$




$$A = \{\omega_5, \omega_6\} \quad P(A) = 0.6$$

$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\} \quad P(B) = 0.7$$

$$A \cap B = \{\omega_5\} \quad P(A \cap B) = 0.5$$

Przykład

Rozważmy to samo zadanie dla **nieuczciwej** kostki, w której piątka wypada z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$, a pozostałe liczby z prawd. $\frac{1}{10}$



$$A = \{\omega_5, \omega_6\} \quad P(A) = 0.6$$


$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\} \quad P(B) = 0.7$$

$$A \cap B = \{\omega_5\} \quad P(A \cap B) = 0.5$$

Jeśli zaszło B , łączne prawdopodobieństwo wszystkich możliwych wyników zmniejszyło się z $P(\Omega) = 1$ do $P(B) = 0.7$

Przykład

Rozważmy to samo zadanie dla **nieuczciwej** kostki, w której piątka wypada z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$, a pozostałe liczby z prawd. $\frac{1}{10}$



$$A = \{\omega_5, \omega_6\} \quad P(A) = 0.6$$

$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5\} \quad P(B) = 0.7$$


$$A \cap B = \{\omega_5\} \quad P(A \cap B) = 0.5$$

Jeśli zaszło B , łączne prawdopodobieństwo wszystkich możliwych wyników zmniejszyło się z $P(\Omega) = 1$ do $P(B) = 0.7$

Z tego $P(A \cap B) = 0.5$ prawdopodobieństwa sprzyja zdarzeniu A

Przykład

Rozważmy to samo zadanie dla **nieuczciwej** kostki, w której piątka wypada z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$, a pozostałe liczby z prawd. $\frac{1}{10}$



$$A = \{\omega_5, \omega_6\} \quad P(A) = 0.6$$

$$B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_2, \omega_4\} \quad P(B) = 0.7$$

$$A \cap B = \{\omega_5\} \quad P(A \cap B) = 0.5$$

Jeśli zaszło B , łączne prawdopodobieństwo wszystkich możliwych wyników zmniejszyło się z $P(\Omega) = 1$ do $P(B) = 0.7$

Z tego $P(A \cap B) = 0.5$ prawdopodobieństwa sprzyja zdarzeniu A

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.5}{0.7} = \frac{5}{7}$$

Prawdopodobieństwo warunkowe

Definicja

Prawdopodobieństwem warunkowym zajścia zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B , gdzie $P(B) > 0$, nazywamy liczbę:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Prawdopodobieństwo warunkowe

Definicja

Prawdopodobieństwem warunkowym zajścia zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B , gdzie $P(B) > 0$, nazywamy liczbę:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Jeśli $P(B) = 0$, to jak to możliwe, że B w ogóle by zaszło?
- Nie ma jednoznacznej relacji między $P(A)$ a $P(A|B)$ – może się zdarzyć, że $P(A|B) < P(A)$, $P(A|B) = P(A)$ lub $P(A|B) > P(A)$!

Prawdopodobieństwo warunkowe

Definicja

Prawdopodobieństwem warunkowym zajścia zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B , gdzie $P(B) > 0$, nazywamy liczbę:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Jeśli $P(B) = 0$, to jak to możliwe, że B w ogóle by zaszło?
- Nie ma jednoznacznej relacji między $P(A)$ a $P(A|B)$ – może się zdarzyć, że $P(A|B) < P(A)$, $P(A|B) = P(A)$ lub $P(A|B) > P(A)$!

Zadanie 1

Podaj przykłady zdarzeń takich, że (a) $P(A|B) < P(A)$, (b) $P(A|B) = P(A)$, (c) $P(A|B) > P(A)$

Prawdopodobieństwo warunkowe

Definicja

Prawdopodobieństwem warunkowym zajścia zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B , gdzie $P(B) > 0$, nazywamy liczbę:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Jeśli $P(B) = 0$, to jak to możliwe, że B w ogóle by zaszło?
- Nie ma jednoznacznej relacji między $P(A)$ a $P(A|B)$ – może się zdarzyć, że $P(A|B) < P(A)$, $P(A|B) = P(A)$ lub $P(A|B) > P(A)$!

Zadanie 1

Podaj przykłady zdarzeń takich, że (a) $P(A|B) < P(A)$, (b) $P(A|B) = P(A)$, (c) $P(A|B) > P(A)$

Uwaga: Jeśli $P(A), P(B) > 0$ to przez symetrię:

$$P(A \cap B) = P(B)P(A|B) = P(A)P(B|A)$$

Prawdopodobieństwo warunkowe

Zadanie 2

Pokaż, że $P(A|B)$ jako funkcja A przy ustalonym B spełnia aksjomaty Kołmogorowa.

Posiada więc wszystkie udowodnione własności prawdopodobieństwa:

$$P(A|B) = 1 - P(A'|B)$$

$$P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 \cap A_2|B)$$

itp.

Przykład

Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii. Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa, jeśli Małgosia wylosowała asa?

Przykład

Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii. Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa, jeśli Małgosia wylosowała asa?

Zdarzenie elementarne: para wylosowanych kart (J, M) , gdzie $J, M \in \{2♥, 2♦, 2♣, 2♠, \dots, A♥, A♦, A♣, A♠\}$

$$|\Omega| = 52 \times 51$$

Przykład

Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii. Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa, jeśli Małgosia wylosowała asa?

Zdarzenie elementarne: para wylosowanych kart (J, M) , gdzie $J, M \in \{2♥, 2♦, 2♣, 2♠, \dots, A♥, A♦, A♣, A♠\}$

$$|\Omega| = 52 \times 51$$

A – „Jaś ma asa”: $A = \{(A♥, 2♥), (A♠, D♣), (A♣, 7♦), \dots\}$

B – „Małgosia ma asa”: $B = \{(4♠, A♥), (K♣, A♠), (A♥, A♦), \dots\}$

Przykład

Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii. Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa, jeśli Małgosia wylosowała asa?

Zdarzenie elementarne: para wylosowanych kart (J, M) , gdzie $J, M \in \{2♥, 2♦, 2♣, 2♠, \dots, A♥, A♦, A♣, A♠\}$

$$|\Omega| = 52 \times 51$$

A – „Jaś ma asa”: $A = \{(A♥, 2♥), (A♠, D♣), (A♣, 7♦), \dots\}$

B – „Małgosia ma asa”: $B = \{(4♠, A♥), (K♣, A♠), (A♥, A♦), \dots\}$

Z symetrii $P(A) = P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

Przykład

Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii. Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa, jeśli Małgosia wylosowała asa?

Zdarzenie elementarne: para wylosowanych kart (J, M) , gdzie $J, M \in \{2♥, 2♦, 2♣, 2♠, \dots, A♥, A♦, A♣, A♠\}$

$$|\Omega| = 52 \times 51$$

A – „Jaś ma asa”: $A = \{(A♥, 2♥), (A♠, D♣), (A♣, 7♦), \dots\}$

B – „Małgosia ma asa”: $B = \{(4♠, A♥), (K♣, A♠), (A♥, A♦), \dots\}$

Z symetrii $P(A) = P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

$$A \cap B = \{(A♥, A♠), (A♣, A♦), (A♠, A♣), \dots\}, \quad |A \cap B| = 4 \times 3 = 12$$

Przykład

Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii. Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa, jeśli Małgosia wylosowała asa?

Zdarzenie elementarne: para wylosowanych kart (J, M) , gdzie $J, M \in \{2♥, 2♦, 2♣, 2♠, \dots, A♥, A♦, A♣, A♠\}$

$$|\Omega| = 52 \times 51$$

A – „Jaś ma asa”: $A = \{(A♥, 2♥), (A♠, D♣), (A♣, 7♦), \dots\}$

B – „Małgosia ma asa”: $B = \{(4♠, A♥), (K♣, A♠), (A♥, A♦), \dots\}$

Z symetrii $P(A) = P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

$A \cap B = \{(A♥, A♠), (A♣, A♦), (A♠, A♣), \dots\}$, $|A \cap B| = 4 \times 3 = 12$

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{12}{51 \cdot 52} = \frac{1}{221}$$

Przykład

Jaś i Małgosia losują po jednej karcie z talii. Jaka jest szansa, że Jaś wylosował asa, jeśli Małgosia wylosowała asa?

Zdarzenie elementarne: para wylosowanych kart (J, M) , gdzie $J, M \in \{2♥, 2♦, 2♣, 2♠, \dots, A♥, A♦, A♣, A♠\}$

$$|\Omega| = 52 \times 51$$

A – „Jaś ma asa”: $A = \{(A♥, 2♥), (A♠, D♣), (A♣, 7♦), \dots\}$

B – „Małgosia ma asa”: $B = \{(4♠, A♥), (K♣, A♠), (A♥, A♦), \dots\}$

Z symetrii $P(A) = P(B) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

$A \cap B = \{(A♥, A♠), (A♣, A♦), (A♠, A♣), \dots\}$, $|A \cap B| = 4 \times 3 = 12$

$$P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{12}{51 \cdot 52} = \frac{1}{221}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/221}{1/13} = \frac{1}{17}$$

Przykład

Jaś i Małgosia umówili na randkę. Oboje przychodzą na spotkanie w losowym czasie między 8:00 a 9:00. Jaka jest szansa, że Małgosia przyjdzie **później** niż Jaś, jeśli Jaś przyjdzie po 8:30?

Przykład

Jaś i Małgosia umówili na randkę. Oboje przychodzą na spotkanie w losowym czasie między 8:00 a 9:00. Jaka jest szansa, że Małgosia przyjdzie **później** niż Jaś, jeśli Jaś przyjdzie po 8:30?

A – „Małgosia przyjdzie później niż Jaś”


B – „Jaś przyjdzie po 8:30”

Przykład

Jaś i Małgosia umówili na randkę. Oboje przychodzą na spotkanie w losowym czasie między 8:00 a 9:00. Jaka jest szansa, że Małgosia przyjdzie **później** niż Jaś, jeśli Jaś przyjdzie po 8:30?

A – „Małgosia przyjdzie później niż Jaś”

B – „Jaś przyjdzie po 8:30”




Przykład

Jaś i Małgosia umówili na randkę. Oboje przychodzą na spotkanie w losowym czasie między 8:00 a 9:00. Jaka jest szansa, że Małgosia przyjdzie **później** niż Jaś, jeśli Jaś przyjdzie po 8:30?

A – „Małgosia przyjdzie później niż Jaś”

B – „Jaś przyjdzie po 8:30”




$$|\Omega| = 60 \times 60$$

Przykład

Jaś i Małgosia umówili na randkę. Oboje przychodzą na spotkanie w losowym czasie między 8:00 a 9:00. Jaka jest szansa, że Małgosia przyjdzie **później** niż Jaś, jeśli Jaś przyjdzie po 8:30?

A – „Małgosia przyjdzie później niż Jaś”

B – „Jaś przyjdzie po 8:30”



$$|\Omega| = 60 \times 60$$

$$|B| = 30 \times 60$$


$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{1}{2}$$

Przykład

Jaś i Małgosia umówili na randkę. Oboje przychodzą na spotkanie w losowym czasie między 8:00 a 9:00. Jaka jest szansa, że Małgosia przyjdzie **później** niż Jaś, jeśli Jaś przyjdzie po 8:30?

A – „Małgosia przyjdzie później niż Jaś”

B – „Jaś przyjdzie po 8:30”



$$|\Omega| = 60 \times 60$$

$$|B| = 30 \times 60 \quad P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{1}{2}$$


$$|A \cap B| = \frac{1}{2} \times 30 \times 30 \quad P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{1}{8}$$

Przykład

Jaś i Małgosia umówili na randkę. Oboje przychodzą na spotkanie w losowym czasie między 8:00 a 9:00. Jaka jest szansa, że Małgosia przyjdzie **później** niż Jaś, jeśli Jaś przyjdzie po 8:30?

A – „Małgosia przyjdzie później niż Jaś”

B – „Jaś przyjdzie po 8:30”



$$|\Omega| = 60 \times 60$$

$$|B| = 30 \times 60 \quad P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{1}{2}$$

$$|A \cap B| = \frac{1}{2} \times 30 \times 30 \quad P(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{1}{8}$$

$$P(A|B) = \frac{1/8}{1/2} = \frac{1}{4}$$

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że przynajmniej jedno z dzieci jest chłopcem?

(na potrzeby zadania przyjmij prawd. urodzenia dziewczynki jako $\frac{1}{2}$)

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że przynajmniej jedno z dzieci jest chłopcem?

(na potrzeby zadania przyjmij prawd. urodzenia dziewczynki jako $\frac{1}{2}$)

Odpowiedź: No raczej $\frac{1}{2}$, tak??

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że przynajmniej jedno z dzieci jest chłopcem?

(na potrzeby zadania przyjmij prawd. urodzenia dziewczynki jako $\frac{1}{2}$)

Odpowiedź: No raczej $\frac{1}{2}$, tak??

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$ (pierwsze z pary to np. starsze dziecko)

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że przynajmniej jedno z dzieci jest chłopcem?

(na potrzeby zadania przyjmij prawd. urodzenia dziewczynki jako $\frac{1}{2}$)

Odpowiedź: No raczej $\frac{1}{2}$, tak??

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$ (pierwsze z pary to np. starsze dziecko)

A – „dwóch chłopców”, $A = \{(c, c)\}$

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że przynajmniej jedno z dzieci jest chłopcem?

(na potrzeby zadania przyjmij prawd. urodzenia dziewczynki jako $\frac{1}{2}$)

Odpowiedź: No raczej $\frac{1}{2}$, tak??

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$ (pierwsze z pary to np. starsze dziecko)

A – „dwóch chłopców”, $A = \{(c, c)\}$

B – „co najmniej jeden chłopiec”,

$B = \{(c, c), (c, d), (d, c)\}$, $P(B) = \frac{3}{4}$

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że przynajmniej jedno z dzieci jest chłopcem?

(na potrzeby zadania przyjmij prawd. urodzenia dziewczynki jako $\frac{1}{2}$)

Odpowiedź: No raczej $\frac{1}{2}$, tak??

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$ (pierwsze z pary to np. starsze dziecko)

A – „dwóch chłopców”, $A = \{(c, c)\}$

B – „co najmniej jeden chłopiec”,

$B = \{(c, c), (c, d), (d, c)\}$, $P(B) = \frac{3}{4}$

$A \cap B = \{(c, c)\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że przynajmniej jedno z dzieci jest chłopcem?

(na potrzeby zadania przyjmij prawd. urodzenia dziewczynki jako $\frac{1}{2}$)

Odpowiedź: No raczej $\frac{1}{2}$, tak??

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$ (pierwsze z pary to np. starsze dziecko)

A – „dwóch chłopców”, $A = \{(c, c)\}$

B – „co najmniej jeden chłopiec”,

$B = \{(c, c), (c, d), (d, c)\}$, $P(B) = \frac{3}{4}$

$A \cap B = \{(c, c)\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$

$$P(A|B) = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że przynajmniej jedno z dzieci jest chłopcem?

(na potrzeby zadania przyjmij prawd. urodzenia dziewczynki jako $\frac{1}{2}$)

Odpowiedź: No raczej $\frac{1}{2}$, tak?? Raczej nie...

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$ (pierwsze z pary to np. starsze dziecko)

A – „dwóch chłopców”, $A = \{(c, c)\}$

B – „co najmniej jeden chłopiec”,

$B = \{(c, c), (c, d), (d, c)\}$, $P(B) = \frac{3}{4}$

$A \cap B = \{(c, c)\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$

$$P(A|B) = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$$

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że **starsze** dziecko jest chłopcem?

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że **starsze** dziecko jest chłopcem?

Odpowiedź:

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że **starsze** dziecko jest chłopcem?

Odpowiedź:

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$, gdzie pierwsze z pary to starsze dziecko

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że **starsze** dziecko jest chłopcem?

Odpowiedź:

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$, gdzie pierwsze z pary to starsze dziecko
 A – „dwóch chłopców”, $A = \{(c, c)\}$

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że **starsze** dziecko jest chłopcem?

Odpowiedź:

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$, gdzie pierwsze z pary to starsze dziecko

A – „dwóch chłopców”, $A = \{(c, c)\}$

B – „starsze dziecko to chłopiec”, $B = \{(c, c), (c, d)\}$, $P(B) = \frac{1}{2}$

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że **starsze** dziecko jest chłopcem?

Odpowiedź:

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$, gdzie pierwsze z pary to starsze dziecko

A – „dwóch chłopców”, $A = \{(c, c)\}$

B – „starsze dziecko to chłopiec”, $B = \{(c, c), (c, d)\}$, $P(B) = \frac{1}{2}$

$A \cap B = \{(c, c)\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$

Przykład

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że starsze dziecko jest chłopcem?

Odpowiedź:

$\Omega = \{(c, c), (c, d), (d, c), (d, d)\}$, gdzie pierwsze z pary to starsze dziecko

A – „dwóch chłopców”, $A = \{(c, c)\}$

B – „starsze dziecko to chłopiec”, $B = \{(c, c), (c, d)\}$, $P(B) = \frac{1}{2}$

$A \cap B = \{(c, c)\}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$

$$P(A|B) = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$$

Zadanie

Zadanie 3

Rodzina ma dwójkę dzieci. Jaka jest szansa, że ma dwóch chłopców, jeśli wiemy, że jedno z dzieci ma na imię Franek? (przyjmij, że prawdopodobieństwo nadania chłopcu imienia Franek wynosi p)

Powyższe zadanie jest interpolacją dwóch poprzednich przykładów (w zależności od wartości prawdopodobieństwa p)

Zadania

Zadanie 4

Mamy w ręku trzy asy i dobieramy dwie dodatkowe karty. Jaka jest szansa na „karetę” (cztery asy)?

Podobnie: jaka jest szansa na karetę, jeśli mamy w ręku dwa asy i dobieramy trzy karty?

Zadanie 5

Losujemy dwie liczby x i y z przedziału $[0, 1]$. Jaka jest szansa, że (a) $x \leq \frac{1}{2}$ jeśli $x + y \leq 1$; (b) $x \leq \frac{1}{2}$ jeśli $\max\{x, y\} \geq \frac{2}{3}$? Przyjmij model prawdopodobieństwa geometrycznego

Reguła łańcuchowa

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) \quad (\text{z definicji})$$

Reguła łańcuchowa

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) \quad (\text{z definicji})$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P((A_1 \cap A_2) \cap A_3)$$

Reguła łańcuchowa

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) \quad (\text{z definicji})$$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P((A_1 \cap A_2) \cap A_3) \\ &= P(A_1 \cap A_2)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (\text{z def.}) \end{aligned}$$

Reguła łańcuchowa

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) \quad (\text{z definicji})$$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P((A_1 \cap A_2) \cap A_3) \\ &= P(A_1 \cap A_2)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (\text{z def.}) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (\text{z def.}) \end{aligned}$$

Reguła łańcuchowa

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) \quad (\text{z definicji})$$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P((A_1 \cap A_2) \cap A_3) \\ &= P(A_1 \cap A_2)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (\text{z def.}) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (\text{z def.}) \end{aligned}$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) = P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3) \quad (\text{z def.})$$

Reguła łańcuchowa

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) \quad (\text{z definicji})$$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P((A_1 \cap A_2) \cap A_3) \\ &= P(A_1 \cap A_2)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (\text{z def.}) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (\text{z def.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) &= P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3) \quad (\text{z def.}) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2)P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3) \end{aligned}$$

Reguła łańcuchowa

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1) \quad (\text{z definicji})$$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P((A_1 \cap A_2) \cap A_3) \\ &= P(A_1 \cap A_2)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (\text{z def.}) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \quad (\text{z def.}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) &= P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3) \quad (\text{z def.}) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2)P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\ &\dots \end{aligned}$$

Reguła łańcuchowa

Twierdzenie

Jeśli zdarzenia A_1, A_2, \dots, A_n spełniają warunek:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0,$$

to:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Reguła łańcuchowa

Twierdzenie

Jeśli zdarzenia A_1, A_2, \dots, A_n spełniają warunek:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0,$$

to:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

Uwaga: Warunek $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$ implikuje, że:

$$P(A_1) > 0, \quad P(A_1 \cap A_2) > 0, \quad P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) > 0, \dots$$

a więc wszystkie prawdopodobieństwa warunkowe mają sens.

Przykład

Losujemy trzy karty z talii. Jaka jest szansa, że wszystkie będą asami?

Przykład

Losujemy trzy karty z talii. Jaka jest szansa, że wszystkie będą asami?

Rozwiązanie: Niech A_i oznacza „ i -ta karta w ręce to as” ($i = 1, 2, 3$).
Wtedy $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ oznacza „trzy asy”

Przykład

Losujemy trzy karty z talii. Jaka jest szansa, że wszystkie będą asami?

Rozwiązanie: Niech A_i oznacza „ i -ta karta w ręce to as” ($i = 1, 2, 3$).
Wtedy $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ oznacza „trzy asy”

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50}$$

Układ zupełny zdarzeń


Mówimy, że zdarzenia A_1, A_2, \dots, A_n tworzą **układ zupełny zdarzeń**, jeśli

1. Są parami rozłączne: $A_i \cap A_j = \emptyset$ dla $i \neq j$
2. Pokrywają całą przestrzeń: $A_1 \cup A_2 \dots \cup A_n = \Omega$

Układ zupełny zdarzeń

Mówimy, że zdarzenia A_1, A_2, \dots, A_n tworzą **układ zupełny zdarzeń**, jeśli

1. Są parami rozłączne: $A_i \cap A_j = \emptyset$ dla $i \neq j$
2. Pokrywają całą przestrzeń: $A_1 \cup A_2 \dots \cup A_n = \Omega$



Układ zupełny zdarzeń rozbija przestrzeń Ω na n **rozłącznych** części.

Przykład: Przy rzucie kością zbiory $A_1 = \{\omega_1, \omega_3\}$, $A_2 = \{\omega_2, \omega_5, \omega_6\}$, $A_3 = \{\omega_4\}$ tworzą układ zupełny.

Wzór na prawdopodobieństwo całkowite

Twierdzenie

Jeśli A_1, \dots, A_n jest układem zupełnym, to dla dowolnego zdarzenia B :


$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

Wzór na prawdopodobieństwo całkowite

Twierdzenie

Jeśli A_1, \dots, A_n jest układem zupełnym, to dla dowolnego zdarzenia B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$




Wzór na prawdopodobieństwo całkowite

Twierdzenie

Jeśli A_1, \dots, A_n jest układem zupełnym, to dla dowolnego zdarzenia B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$



Wzór na prawdopodobieństwo całkowite

Twierdzenie

Jeśli A_1, \dots, A_n jest układem zupełnym, to dla dowolnego zdarzenia B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)$$

Dowód: Ponieważ

$$B = B \cap \Omega = B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n),$$

a zdarzenia $B \cap A_i$, $i = 1, \dots, n$, są parami rozłączne, to

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i),$$

gdzie skorzystaliśmy z definicji $P(B|A_i) = \frac{P(B \cap A_i)}{P(A_i)}$.

Przykład

Studenci są podzieleni na 3 grupy o licznosci 20, 25 i 30. W grupie 1 na pytanie potrafi odpowiedziec 50% studentow, w grupie 2 – 60% a w grupie 3 – 30%. Jaka jest szansa, ze losowo wybrany student (spozród wszystkich grup) odpowie na pytanie?

Przykład

Studenci są podzieleni na 3 grupy o licznosci 20, 25 i 30. W grupie 1 na pytanie potrafi odpowiedziec 50% studentów, w grupie 2 – 60% a w grupie 3 – 30%. Jaka jest szansa, że losowo wybrany student (spośród wszystkich grup) odpowie na pytanie?

- Ω jest zbiorem wszystkich studentów ($|\Omega| = 75$)
- Grupy (podzbiory) A_1, A_2, A_3 tworzą układ zupełny
- Zdarzenie B – zbiór studentów, którzy znają odpowiedź na pytanie

Przykład

Studenci są podzieleni na 3 grupy o licznosci 20, 25 i 30. W grupie 1 na pytanie potrafi odpowiedziec 50% studentów, w grupie 2 – 60% a w grupie 3 – 30%. Jaka jest szansa, że losowo wybrany student (spośród wszystkich grup) odpowie na pytanie?

- Ω jest zbiorem wszystkich studentów ($|\Omega| = 75$)
- Grupy (podzbiory) A_1, A_2, A_3 tworzą układ zupełny
- Zdarzenie B – zbiór studentów, którzy znają odpowiedź na pytanie

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

Przykład

Studenci są podzieleni na 3 grupy o licznosci 20, 25 i 30. W grupie 1 na pytanie potrafi odpowiedziec 50% studentow, w grupie 2 – 60% a w grupie 3 – 30%. Jaka jest szansa, ze losowo wybrany student (spozród wszystkich grup) odpowie na pytanie?

- Ω jest zbiorem wszystkich studentow ($|\Omega| = 75$)
- Grupy (podzbiory) A_1, A_2, A_3 tworzą układ zupełny
- Zdarzenie B – zbiór studentow, którzy znaję odpowiedź na pytanie

$$\begin{aligned}P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= \frac{20}{75} \cdot 0.5 + \frac{25}{75} \cdot 0.6 + \frac{30}{75} \cdot 0.3\end{aligned}$$

Przykład

Studenci są podzieleni na 3 grupy o licznosci 20, 25 i 30. W grupie 1 na pytanie potrafi odpowiedziec 50% studentow, w grupie 2 – 60% a w grupie 3 – 30%. Jaka jest szansa, ze losowo wybrany student (spozród wszystkich grup) odpowie na pytanie?

- Ω jest zbiorem wszystkich studentow ($|\Omega| = 75$)
- Grupy (podzbiory) A_1, A_2, A_3 tworzą układ zupełny
- Zdarzenie B – zbiór studentow, którzy znajà odpowiedz na pytanie

$$\begin{aligned}P(B) &= P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\&= \frac{20}{75} \cdot 0.5 + \frac{25}{75} \cdot 0.6 + \frac{30}{75} \cdot 0.3 \\&= \frac{10}{75} + \frac{15}{75} + \frac{9}{75} = \frac{34}{75}\end{aligned}$$

Przykład

W pewnej loterii w pojedynczym losowaniu szansa wygranej to p , szansa przegranej to q , a z prawdopodobieństwem r wyciągamy los „graj ponownie”, który zwracamy do urny i losujemy jeszcze raz. Oczywiście, $p + q + r = 1$. Oblicz prawdopodobieństwo wygranej.

Przykład

W pewnej loterii w pojedynczym losowaniu szansa wygranej to p , szansa przegranej to q , a z prawdopodobieństwem r wyciągamy los „graj ponownie”, który zwracamy do urny i losujemy jeszcze raz. Oczywiście, $p + q + r = 1$. Oblicz prawdopodobieństwo wygranej.

Oznaczmy zdarzenia:

- W – wygrana w loterii
- A – wyciągnęliśmy los wygrywający, $P(A) = p$
- B – wyciągnęliśmy los przegrywający, $P(B) = q$
- C – wyciągnęliśmy los „graj ponownie”, $P(C) = r$

Przykład

W pewnej loterii w pojedynczym losowaniu szansa wygranej to p , szansa przegranej to q , a z prawdopodobieństwem r wyciągamy los „graj ponownie”, który zwracamy do urny i losujemy jeszcze raz. Oczywiście, $p + q + r = 1$. Oblicz prawdopodobieństwo wygranej.

Oznaczmy zdarzenia:

- W – wygrana w loterii
- A – wyciągnęliśmy los wygrywający, $P(A) = p$
- B – wyciągnęliśmy los przegrywający, $P(B) = q$
- C – wyciągnęliśmy los „graj ponownie”, $P(C) = r$

A, B, C tworzą układ zupełny, stąd:

$$P(W) = P(W|A)P(A) + P(W|B)P(B) + P(W|C)P(C)$$

Przykład

W pewnej loterii w pojedynczym losowaniu szansa wygranej to p , szansa przegranej to q , a z prawdopodobieństwem r wyciągamy los „graj ponownie”, który zwracamy do urny i losujemy jeszcze raz. Oczywiście, $p + q + r = 1$. Oblicz prawdopodobieństwo wygranej.

Oznaczmy zdarzenia:

- W – wygrana w loterii
- A – wyciągnęliśmy los wygrywający, $P(A) = p$
- B – wyciągnęliśmy los przegrywający, $P(B) = q$
- C – wyciągnęliśmy los „graj ponownie”, $P(C) = r$

A, B, C tworzą układ zupełny, stąd:

$$\begin{aligned}P(W) &= P(W|A)P(A) + P(W|B)P(B) + P(W|C)P(C) \\ &= 1 \cdot p + 0 \cdot q + P(W) \cdot r = p + rP(W)\end{aligned}$$

Rozwiązując równanie otrzymujemy: $P(W) = \frac{p}{1-r} = \frac{p}{p+q}$

Zadanie

Zadanie 6

Rzucamy kostką, jeśli wypadnie jedno oczko to rzucamy ponownie i dodajemy wyniki. Jaka jest szansa, że (sumarycznie) wyrzucimy wartość powyżej 4?

Zadanie 7

Mamy b białych i c czarnych kul w urnie. Wyciągamy jedną kulę i od razu ją wyrzucamy (poza urnę!), nie sprawdzając koloru. Jakie jest prawdopodobieństwo wyciągnięcia za drugim razem kuli białej?

Paradoks Simpsona

W miastach *A* i *B* zebrano dane dotyczące włamań do mieszkań i domów:

miasto	% włamań do:	
	mieszkań	domów
<i>A</i>	2%	6%
<i>B</i>	3%	7%

W którym z miast jest większe prawdopodobieństwo włamania do lokalu?

Paradoks Simpsona

W miastach *A* i *B* zebrano dane dotyczące włamań do mieszkań i domów:

miasto	% włamań do:	
	mieszkań	domów
<i>A</i>	2%	6%
<i>B</i>	3%	7%

miasto	liczba:	
	mieszkań	domów
<i>A</i>	1000	1000
<i>B</i>	1800	200

W którym z miast jest większe prawdopodobieństwo włamania do lokalu?

Paradoks Simpsona

W miastach A i B zebrano dane dotyczące włamań do mieszkań i domów:

miasto	% włamań do:	
	mieszkań	domów
A	2%	6%
B	3%	7%

miasto	liczba:	
	mieszkań	domów
A	1000	1000
B	1800	200

W którym z miast jest większe prawdopodobieństwo włamania do lokalu?

Z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym:

$$P(\text{włam.}) = P(\text{włam.}|\text{mieszkanie})P(\text{mieszkanie}) + P(\text{włam.}|\text{dom})P(\text{dom})$$

Paradoks Simpsona

W miastach A i B zebrano dane dotyczące włamań do mieszkań i domów:

miasto	% włamań do:	
	mieszkań	domów
A	2%	6%
B	3%	7%

miasto	liczba:	
	mieszkań	domów
A	1000	1000
B	1800	200

W którym z miast jest większe prawdopodobieństwo włamania do lokalu?

Z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym:

$$P(\text{włam.}) = P(\text{włam.}|\text{mieszkanie})P(\text{mieszkanie}) + P(\text{włam.}|\text{dom})P(\text{dom})$$

- W mieście A : $P(\text{włam.}) = 0.02 \cdot \frac{1000}{2000} + 0.06 \cdot \frac{1000}{2000} = 0.04 = 4\%$
- W mieście B : $P(\text{włam.}) = 0.03 \cdot \frac{1800}{2000} + 0.07 \cdot \frac{200}{2000} = 0.034 = 3.4\%$

Paradoks Simpsona

W miastach A i B zebrano dane dotyczące włamań do mieszkań i domów:

miasto	% włamań do:	
	mieszkań	domów
A	2%	6%
B	3%	7%

miasto	liczba:	
	mieszkań	domów
A	1000	1000
B	1800	200

W którym z miast jest większe prawdopodobieństwo włamania do lokalu?

Z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym:

$$P(\text{włam.}) = P(\text{włam.}|\text{mieszkanie})P(\text{mieszkanie}) + P(\text{włam.}|\text{dom})P(\text{dom})$$

- W mieście A : $P(\text{włam.}) = 0.02 \cdot \frac{1000}{2000} + 0.06 \cdot \frac{1000}{2000} = 0.04 = 4\%$
- W mieście B : $P(\text{włam.}) = 0.03 \cdot \frac{1800}{2000} + 0.07 \cdot \frac{200}{2000} = 0.034 = 3.4\%$

Paradoks Simpsona: efekt działania w obrębie grup odwraca się, gdy grupy są połączone

Paradoks Simpsona

Kwestia dyskryminacji ze względu na płeć na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (1973)

	# aplikujących	# przyjętych
mężczyźni	8442	44%
kobiety	4321	35%

Paradoks Simpsona

Kwestia dyskryminacji ze względu na płeć na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (1973)

	# aplikujących	# przyjętych
mężczyźni	8442	44%
kobiety	4321	35%

Badania statystyczne wykazały jednak odwrotną tendencję:

wydział	% mężczyźni		% kobiety	
	aplikujących	przyjętych	aplikujących	przyjętych
A	825	62%	108	82%
B	560	63%	25	68%
C	325	37%	593	34%
D	417	33%	375	35%
E	191	28%	393	24%
F	272	6%	341	7%

Wzór Bayesa

Twierdzenie

Jeśli A_1, \dots, A_n jest układem zupełnym zdarzeń z $P(A_i) > 0$ dla wszystkich $i = 1, \dots, n$, a B zdarzeniem takim, że $P(B) > 0$ to:

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j)P(A_j)}$$

Wzór Bayesa

Twierdzenie

Jeśli A_1, \dots, A_n jest układem zupełnym zdarzeń z $P(A_i) > 0$ dla wszystkich $i = 1, \dots, n$, a B zdarzeniem takim, że $P(B) > 0$ to:

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j)P(A_j)}$$

Dowód:

Ponieważ $P(A_i | B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$, mamy $P(A_i \cap B) = P(A_i | B)P(B)$.

Wzór Bayesa

Twierdzenie

Jeśli A_1, \dots, A_n jest układem zupełnym zdarzeń z $P(A_i) > 0$ dla wszystkich $i = 1, \dots, n$, a B zdarzeniem takim, że $P(B) > 0$ to:

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j)P(A_j)}$$

Dowód:

Ponieważ $P(A_i | B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$, mamy $P(A_i \cap B) = P(A_i | B)P(B)$.

Podobnie z $P(B | A_i) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(A_i)}$ wynika $P(A_i \cap B) = P(B | A_i)P(A_i)$

Wzór Bayesa

Twierdzenie

Jeśli A_1, \dots, A_n jest układem zupełnym zdarzeń z $P(A_i) > 0$ dla wszystkich $i = 1, \dots, n$, a B zdarzeniem takim, że $P(B) > 0$ to:

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j)P(A_j)}$$

Dowód:

Ponieważ $P(A_i | B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$, mamy $P(A_i \cap B) = P(A_i | B)P(B)$.

Podobnie z $P(B | A_i) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(A_i)}$ wynika $P(A_i \cap B) = P(B | A_i)P(A_i)$

Przyrównując oba wzory stronami dostajemy:

$$P(A_i | B)P(B) = P(B | A_i)P(A_i) \implies P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{P(B)}$$

Wzór Bayesa

Twierdzenie

Jeśli A_1, \dots, A_n jest układem zupełnym zdarzeń z $P(A_i) > 0$ dla wszystkich $i = 1, \dots, n$, a B zdarzeniem takim, że $P(B) > 0$ to:

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B | A_j)P(A_j)}$$

Dowód:

Ponieważ $P(A_i | B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)}$, mamy $P(A_i \cap B) = P(A_i | B)P(B)$.

Podobnie z $P(B | A_i) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(A_i)}$ wynika $P(A_i \cap B) = P(B | A_i)P(A_i)$

Przyrównując oba wzory stronami dostajemy:

$$P(A_i | B)P(B) = P(B | A_i)P(A_i) \implies P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{P(B)}$$

Druga z równości wynika ze wzoru na prawdopodobieństwo całkowite.

Znaczenie wzoru Bayesa

Wzór Bayesa używa jest często we **wnioskowaniu** na temat zbioru hipotez A_1, \dots, A_n .

Każda z hipotez ma pewne prawdopodobieństwo **a priori** $P(A_i)$.

Po przeprowadzeniu doświadczenia, wynikiem którego jest B , wzór Bayesa pozwala obliczyć prawdopodobieństwa **a posteriori** $P(A_i | B)$ każdej z hipotez.



Thomas Bayes
(1702-1761)

Przykład

W pewnym mieście są dwa kierunki studiów informatycznych.

Na popularniejszy kierunek A_1 uczęszcza 75% studentów, na A_2 – pozostałe 25%.

Aplikacje napisane przez studentów z kierunku A_1 zawieszają się w 5% przypadków, a przez studentów z A_2 – w 15%.

Dostaliśmy program, który się zawiesił. Jaka jest szansa, że napisali go studenci z kierunku A_1 , a jaka, że z kierunku A_2 ?

Przykład

W pewnym mieście są dwa kierunki studiów informatycznych.

Na popularniejszy kierunek A_1 uczęszcza 75% studentów, na A_2 – pozostałe 25%.

Aplikacje napisane przez studentów z kierunku A_1 zawieszają się w 5% przypadków, a przez studentów z A_2 – w 15%.

Dostaliśmy program, który się zawiesił. Jaka jest szansa, że napisali go studenci z kierunku A_1 , a jaka, że z kierunku A_2 ?

Odpowiedź:

B – „aplikacja się zawiesiła”, $P(B|A_1) = \frac{1}{20}$, $P(B|A_2) = \frac{3}{20}$

Przykład

W pewnym mieście są dwa kierunki studiów informatycznych.

Na popularniejszy kierunek A_1 uczęszcza 75% studentów, na A_2 – pozostałe 25%.

Aplikacje napisane przez studentów z kierunku A_1 zawieszają się w 5% przypadków, a przez studentów z A_2 – w 15%.

Dostaliśmy program, który się zawiesił. Jaka jest szansa, że napisali go studenci z kierunku A_1 , a jaka, że z kierunku A_2 ?

Odpowiedź:

B – „aplikacja się zawiesiła”, $P(B|A_1) = \frac{1}{20}$, $P(B|A_2) = \frac{3}{20}$

Prawdopodobieństwa a priori: $P(A_1) = \frac{3}{4}$, $P(A_2) = \frac{1}{4}$.

Przykład

W pewnym mieście są dwa kierunki studiów informatycznych.

Na popularniejszy kierunek A_1 uczęszcza 75% studentów, na A_2 – pozostałe 25%.

Aplikacje napisane przez studentów z kierunku A_1 zawieszają się w 5% przypadków, a przez studentów z A_2 – w 15%.

Dostaliśmy program, który się zawiesił. Jaka jest szansa, że napisali go studenci z kierunku A_1 , a jaka, że z kierunku A_2 ?

Odpowiedź:

B – „aplikacja się zawiesiła”, $P(B|A_1) = \frac{1}{20}$, $P(B|A_2) = \frac{3}{20}$

Prawdopodobieństwa a priori: $P(A_1) = \frac{3}{4}$, $P(A_2) = \frac{1}{4}$.

Prawdopodobieństwa a posteriori: $P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B|A_1)P(A_1)+P(B|A_2)P(A_2)}$

$$P(A_1|B) = \frac{\frac{1}{20} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{1}{20} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{20} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{1}{2}, \quad P(A_2|B) = 1 - P(A_1|B) = \frac{1}{2}$$

Szansa A_2 **wzrosła** z 25% do 50% – dlaczego?

Przykład

Test na rzadką chorobę, na którą zapadają dwie osoby na tysiąc, jest w 100% skuteczny, jeśli osoba jest chora. Jednak jeśli osoba jest zdrowa, test daje odpowiedź **fałszywie pozytywną** w 5% przypadków. Jaka jest szansa, że osoba jest **chora**, jeśli wynik testu jest **pozytywny**?

Przykład

Test na rzadką chorobę, na którą zapadają dwie osoby na tysiąc, jest w 100% skuteczny, jeśli osoba jest chora. Jednak jeśli osoba jest zdrowa, test daje odpowiedź **fałszywie pozytywną** w 5% przypadków. Jaka jest szansa, że osoba jest **chora**, jeśli wynik testu jest **pozytywny**?

Zdarzenia: C – „chory”, Z – „zdrowy”, W_+ – „wynik testu pozytywny”, W_- – „wynik testu negatywny”

Przykład

Test na rzadką chorobę, na którą zapadają dwie osoby na tysiąc, jest w 100% skuteczny, jeśli osoba jest chora. Jednak jeśli osoba jest zdrowa, test daje odpowiedź **fałszywie pozytywną** w 5% przypadków. Jaka jest szansa, że osoba jest **chora**, jeśli wynik testu jest **pozytywny**?

Zdarzenia: C – „chory”, Z – „zdrowy”, W_+ – „wynik testu pozytywny”, W_- – „wynik testu negatywny”

$$P(C) = 0.002, \quad P(Z) = 0.998, \quad P(W_+|C) = 1, \quad P(W_+|Z) = 0.05.$$

Przykład

Test na rzadką chorobę, na którą zapadają dwie osoby na tysiąc, jest w 100% skuteczny, jeśli osoba jest chora. Jednak jeśli osoba jest zdrowa, test daje odpowiedź **fałszywie pozytywną** w 5% przypadków. Jaka jest szansa, że osoba jest **chora**, jeśli wynik testu jest **pozytywny**?

Zdarzenia: C – „chory”, Z – „zdrowy”, W_+ – „wynik testu pozytywny”, W_- – „wynik testu negatywny”

$$P(C) = 0.002, \quad P(Z) = 0.998, \quad P(W_+|C) = 1, \quad P(W_+|Z) = 0.05.$$

C i Z tworzą układ zupełny. Z twierdzenia Bayesa:

$$P(C|W_+) = \frac{P(W_+|C)P(C)}{P(W_+|C)P(C) + P(W_+|Z)P(Z)}$$

Przykład

Test na rzadką chorobę, na którą zapadają dwie osoby na tysiąc, jest w 100% skuteczny, jeśli osoba jest chora. Jednak jeśli osoba jest zdrowa, test daje odpowiedź **fałszywie pozytywną** w 5% przypadków. Jaka jest szansa, że osoba jest **chora**, jeśli wynik testu jest **pozytywny**?


Zdarzenia: C – „chory”, Z – „zdrowy”, W_+ – „wynik testu pozytywny”, W_- – „wynik testu negatywny”

$$P(C) = 0.002, \quad P(Z) = 0.998, \quad P(W_+|C) = 1, \quad P(W_+|Z) = 0.05.$$

C i Z tworzą układ zupełny. Z twierdzenia Bayesa:

$$\begin{aligned} P(C|W_+) &= \frac{P(W_+|C)P(C)}{P(W_+|C)P(C) + P(W_+|Z)P(Z)} \\ &= \frac{1 \cdot 0.002}{1 \cdot 0.002 + 0.05 \cdot 0.998} \simeq 0.0385 \end{aligned}$$


Intuicyjne uzasadnienie wyniku



Weźmy 1000 osób.


.

Intuicyjne uzasadnienie wyniku




Weźmy 1000 osób. Spośród nich, **dwie osoby są chore.**

Intuicyjne uzasadnienie wyniku



Weźmy 1000 osób. Spośród nich, **dwie osoby są chore**. Test dał wynik pozytywny **dwóm chorym**, ale również **50 zdrowym (5%)**.


Intuicyjne uzasadnienie wyniku



Weźmy 1000 osób. Spośród nich, **dwie osoby są chore**. Test dał wynik pozytywny **dwóm chorym**, ale również **50 zdrowym (5%)**. Czyli tylko **dwie z 52 osób z wynikiem pozytywnym są chore**.

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)


Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód.
Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?



źródło wszystkich rysunków: wikipedia

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?




źródło wszystkich rysunków: wikipedia

Wstępna odpowiedź:

Skoro zostały dwie zasłonięte bramki, to prawdopodobieństwo wygranej wynosi $\frac{1}{2}$ i nie ma znaczenia, czy gracz zmieni decyzję, czy nie. . .

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?




źródło wszystkich rysunków: wikipedia

Przypadek 1: Gracz nie zmienia decyzji.

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?




źródło wszystkich rysunków: wikipedia

Przypadek 1: Gracz nie zmienia decyzji.


Założmy (bez straty ogólności), że gracz wybrał bramkę nr 1.

Zdarzenie S_i – „samochód w bramce i ” ($i = 1, 2, 3$), $P(S_i) = \frac{1}{3}$.



Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?




źródło wszystkich rysunków: wikipedia

Przypadek 1: Gracz nie zmienia decyzji.

Załóżmy (bez straty ogólności), że gracz wybrał bramkę nr 1.


Zdarzenie S_i – „samochód w bramce i ” ($i = 1, 2, 3$), $P(S_i) = \frac{1}{3}$.



Gracz wygrywa gdy zajdzie zdarzenie S_1 , czyli prawdopodobieństwo wygranej wynosi $\frac{1}{3}$.

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?




źródło wszystkich rysunków: wikipedia

Przypadek 2: Gracz zmienia decyzję.


Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi brankami stoją 2 kozy i samochód.
Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?




źródło wszystkich rysunków: wikipedia

Przypadek 2: Gracz zmienia decyzję.




Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?



źródło wszystkich rysunków: wikipedia


Przypadek 2: Gracz zmienia decyzję.



Gracz **wygrywa** gdy zajdą zdarzenia S_2 lub S_3 i **przegrywa** gdy zajdzie zdarzenie S_1 więc prawdopodobieństwo wygranej wynosi $P(S_2 \cup S_3) = \frac{2}{3}$.

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?




źródło wszystkich rysunków: wikipedia

Dlaczego początkowe rozumowanie zawiodło?

Założmy, że gracz wskazuje bramkę 1, a prowadzący otwiera bramkę 3 (zdarzenie O_3). Jakie jest prawd., że samochód jest w bramce 1?

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?



źródło wszystkich rysunków: wikipedia


Dlaczego początkowe rozumowanie zawiodło?

Założmy, że gracz wskazuje bramkę 1, a prowadzący otwiera bramkę 3 (zdarzenie O_3). Jakie jest prawd., że samochód jest w bramce 1?

$$P(S_1|O_3) = \frac{P(O_3|S_1)P(S_1)}{P(O_3|S_1)P(S_1) + P(O_3|S_2)P(S_2) + P(O_3|S_3)P(S_3)}$$

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?



źródło wszystkich rysunków: wikipedia


Dlaczego początkowe rozumowanie zawiodło?

Założmy, że gracz wskazuje bramkę 1, a prowadzący otwiera bramkę 3 (zdarzenie O_3). Jakie jest prawd., że samochód jest w bramce 1?

$$P(S_1|O_3) = \frac{P(O_3|S_1)P(S_1)}{\underbrace{P(O_3|S_1)P(S_1)}_{=\frac{1}{2}} + \underbrace{P(O_3|S_2)P(S_2)}_{=1} + \underbrace{P(O_3|S_3)P(S_3)}_{=0}}$$

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?



źródło wszystkich rysunków: wikipedia


Dlaczego początkowe rozumowanie zawiodło?

Założmy, że gracz wskazuje bramkę 1, a prowadzący otwiera bramkę 3 (zdarzenie O_3). Jakie jest prawd., że samochód jest w bramce 1?

$$\begin{aligned} P(S_1|O_3) &= \frac{P(O_3|S_1)P(S_1)}{\underbrace{P(O_3|S_1)P(S_1)}_{=\frac{1}{2}} + \underbrace{P(O_3|S_2)P(S_2)}_{=1} + \underbrace{P(O_3|S_3)P(S_3)}_{=0}} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Przykład (paradoks Monty'ego Halla)

Za 3 zasłoniętymi bramkami stoją 2 kozy i samochód. Gracz wybiera jedną z bramek. Prowadzący odsłania inną bramkę (z kozą) i proponuje graczowi zmianę wyboru. Czy decyzja gracza zmienia szanse wygranej?



źródło wszystkich rysunków: wikipedia

Dlaczego początkowe rozumowanie zawiodło?

Założmy, że gracz wskazuje bramkę 1, a prowadzący otwiera bramkę 3 (zdarzenie O_3). Jakie jest prawd., że samochód jest w bramce 1?

$$\begin{aligned} P(S_1|O_3) &= \frac{P(O_3|S_1)P(S_1)}{\underbrace{P(O_3|S_1)P(S_1)}_{=\frac{1}{2}} + \underbrace{P(O_3|S_2)P(S_2)}_{=1} + \underbrace{P(O_3|S_3)P(S_3)}_{=0}} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Podobnie, $P(S_2|O_3) = \frac{2}{3}$, czyli opłaca się zmienić bramkę.

Przykład

Trzej więźniowie – Arnold, Bernard i Cezary – czekają na ścięcie przez kata. Król postanowił ułaskawić jednego z nich (wybranego losowo). Arnold przekupił strażnika, aby ten wyjawiał mu kto zostanie ścięty (choć o losie Arnolda nie powie nic). Strażnik powiedział, że Bernard. Jaka jest szansa, że Arnold również zostanie ścięty?

Przykład

Trzej więźniowie – Arnold, Bernard i Cezary – czekają na ścięcie przez kata. Król postanowił ułaskawić jednego z nich (wybranego losowo). Arnold przekupił strażnika, aby ten wyjawiał mu kto zostanie ścięty (choć o losie Arnolda nie powie nic). Strażnik powiedział, że Bernard. Jaka jest szansa, że Arnold również zostanie ścięty?

Odpowiedź: $\frac{1}{2}$, bo albo Arnold, albo Cezary zostanie ułaskawiony??

Przykład

Trzej więźniowie – Arnold, Bernard i Cezary – czekają na ścięcie przez kata. Król postanowił ułaskawić jednego z nich (wybranego losowo). Arnold przekupił strażnika, aby ten wyjawiał mu kto zostanie ścięty (choć o losie Arnolda nie powie nic). Strażnik powiedział, że Bernard. Jaka jest szansa, że Arnold również zostanie ścięty?

Odpowiedź: $\frac{1}{2}$, bo albo Arnold, albo Cezary zostanie ułaskawiony??

Nie, szansa wynosi $\frac{1}{3}$. Czegokolwiek dowie się Arnold, nie da mu żadnych informacji o jego losie.

(Sytuacja dokładnie jak w paradoksie Monty'ego Halla przy braku zmiany decyzji, gdzie bramki=więźniowie, wygrana=ułaskawienie, itp.)

Zadanie

Zadanie 8

Zadanie egzaminacyjne (typu testowego) ma 5 możliwych odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Wśród 100 egzaminowanych studentów tylko 30 potrafi rozwiązać to zadanie, a pozostali będą wybierać jedną z odpowiedzi losowo. Jakie jest prawdopodobieństwo, że egzaminowany student potrafi rozwiązać zadanie, jeśli zaznaczył poprawną odpowiedź?